

ВВЕДЕНИЕ

Порядок проведения, методика и система оценивания (проверки) регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике 2017–2018 учебного года.

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике 2017–2018 учебного года проводится по заданиям, подготовленным Центральной предметно-методической комиссией, в единые для всех субъектов РФ сроки: **31 января 2018 г.** (I тур) и **1 февраля 2018 г.** (II тур). Региональный этап проводится по отдельным заданиям для учащихся 9, 10 и 11 классов.

Задания для каждого класса включают 10 задач — по 5 задач в каждом из двух дней (туров) Олимпиады (задачи 1–5 — I тур, задачи 6–10 — II тур). Продолжительность каждого тура для каждого класса составляет 4 астрономических часа.

В силу того, что во всех субъектах Российской Федерации региональный этап проводится по одним и тем же заданиям, подготовленным Центральной предметно-методической комиссией, в целях предотвращения преждевременного доступа к текстам заданий со стороны участников Олимпиады, а также их учителей и наставников, время начала и окончания туров в установленные даты в каждом субъекте РФ должно определяться в соответствии с **«Временными регламентами проведения туров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в субъектах Российской Федерации в 2017–2018 учебном году»** для часовых поясов.

Показ работ, проведение апелляций и разбор задач в субъектах Российской Федерации, где тур оканчивается в 16.00 и 17.00 по местному времени, проводятся не раньше, чем на следующий день после проведения второго тура Олимпиады.

В остальных субъектах Российской Федерации рекомендуется также осуществлять показ работ и проведение апелляций не раньше, чем на следующий день после проведения второго тура Олимпиады.

Победители и призёры олимпиады определяются Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников и Требованиями к проведению регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике в 2017–2018 учебном году.

Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 7. Максимальное количество баллов, которое может получить участник, равно 70 (35 — I тур, 35 — II тур).

Задания математических олимпиад являются творческими, допускают несколько различных вариантов решений. Кроме того, необ-

ходимо оценивать частичные продвижения в задачах (например, разбор важного случая, доказательство вспомогательного утверждения, нахождение примера и т.п.). Наконец, возможны логические и арифметические ошибки в решениях. Окончательные баллы по задаче должны учитывать всё вышеперечисленное.

Ниже приведена стандартная методика оценивания решений.

Баллы	Правильность (ошибочность) решения
7	Полное верное решение.
6–7	Верное решение, но имеются небольшие недочёты, в целом не влияющие на решение.
5–6	Решение в целом верное. Однако оно содержит ошибки, либо пропущены случаи, не влияющие на логику рассуждений.
3–4	В том случае, когда решение задачи делится на две равноценные части — решение одной из частей.
2–3	Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении задачи.
0–1	Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения.
0	Решение неверное, продвижения отсутствуют.
0	Решение отсутствует.

Важно отметить, что любое правильное решение оценивается в 7 баллов. Недопустимо снимать баллы за то, что текст решения слишком длинный, или за то, что верное решение школьника отличается от приведённого в данной методической разработке или от других решений, известных жюри. В то же время любой сколь угодно длинный текст, не содержащий полезных продвижений, должен быть оценен в 0 баллов.

Ниже приведены ответы и решения к задачам олимпиады. В комментариях к задачам указаны критерии оценивания (в баллах) некоторых предполагаемых ошибок и частичных продвижений. Заметим, что работа участника, помимо приведённых, может включать другие содержательные продвижения и ошибки, которые должны быть оценены дополнительно.

Желаем успешной работы!

Авторы и составители сборника

10 класс

- 10.1. Разбейте какой-нибудь клетчатый квадрат на клетчатые квадратики так, чтобы не все квадратики были одинаковы, но квадратов каждого размера было одно и то же количество.

(Методкомиссия)

Решение. Один из многих возможных примеров приведён на рис. 4.

Комментарий. Любой верный пример разрезания — 7 баллов.




Рис. 4

- 10.2. Петя и Вася по очереди выписывают на доску натуральные числа, не превосходящие 2018 (выписывать уже имеющееся число запрещено); начинает Петя. Если после хода игрока на доске оказываются три числа, образующих арифметическую прогрессию, — этот игрок выигрывает. У кого из игроков есть стратегия, позволяющая ему гарантированно выиграть?

(М. Дидин, П. Кожеевников)

Ответ. У Васи.

Решение. Рассмотрим момент после третьего хода (когда выписаны три числа). Если к этому моменту никто еще не выиграл, то следующим ходом Вася выигрывает — ему достаточно найти два выписанных числа одной чётности и выписать своим ходом их среднее арифметическое (оно является целым числом).

Кроме того, заметим, что если три целых числа из множества $1, 2, 3, \dots, 2018$ образуют арифметическую прогрессию, то её разность не больше 1008 (иначе разность между наибольшим и наименьшим числами будет не менее $2 \cdot 1009 = 2018$, что невозможно).

Теперь опишем выигрывающую стратегию Васи.

Пусть первым ходом Петя выписал число a . Предположим, что $a \leq 1009$. Тогда Вася выписывает то из чисел 2017 или 2018, чётность которого отлична от чётности числа a (обозначим это число через b). После этого хода выписано два числа разной чётности; значит, они не могут быть первым и третьим членом прогрессии из целых чисел. А поскольку $b - a \geq 1009$, они также не могут быть соседними членами прогрессии. Тем самым, Петя

не сможет выиграть третьим ходом. Но в этом случае, как мы видели ранее, следующим ходом Вася выигрывает.

Если же $a \geq 1010$, то Вася отвечает, выписывая то из чисел 1 и 2, которое по чётности отличается от a . Дальнейшие рассуждения аналогичны первому случаю.

Комментарий. Верный ответ без обоснований (или с неверным обоснованием) — 0 баллов.

Предъявление стратегии, которая не работает хотя бы в одном случае — 0 баллов.

Предъявлена верная стратегия для Васи без обоснования, что она работает — 5 баллов.

Доказано только, что в момент, когда на доске выписаны три числа, следующим ходом всегда можно выиграть — 2 балла.

- 10.3. Положительные числа x, y таковы, что $x^5 - y^3 \geq 2x$. Докажите, что $x^3 \geq 2y$. (Н. Агаханов)

Решение. Требуемое неравенство равносильно неравенству $x^9 \geq 8y^3$. По условию, $8(x^5 - 2x) \geq 8y^3$; значит, достаточно доказать неравенство $x^9 \geq 8x^5 - 16x$. Переносим в последнем неравенстве все члены в левую часть, получаем неравенство $x(x^4 - 4)^2 \geq 0$, которое верно для положительного x . Значит, и требуемое неравенство также верно.

Комментарий. Задача сведена к доказательству неравенства $x^9 \geq 8x^5 - 16x$ (или эквивалентного) для положительного x — 3 балла.

- 10.4. Пусть O — центр окружности Ω , описанной около остроугольного треугольника ABC . На дуге AC этой окружности, не содержащей точку B , взята точка P . На отрезке BC выбрана точка X так, что $PX \perp AC$. Докажите, что центр окружности, описанной около треугольника BXP , лежит на окружности, описанной около треугольника ABO . (И. Фролов)

Решение. Пусть G — центр окружности γ , описанной около треугольника BXP (см. рис. 5). Тогда $\angle BGP = \widehat{BXP} = 2\angle CXP$ (так как угол CXP острый). Поскольку $GB = GP$ и $OB = OP$, треугольники GOB и GOP равны по трём сторонам, откуда $\angle BGO = \angle OGP = \frac{1}{2} \angle BGP = \angle CXP$. Наконец, из равнобедренного треугольника AOB получаем $\angle BAO = 90^\circ -$

$-\frac{1}{2} \angle AOB = 90^\circ - \angle ACB = \angle CXP$. Итак, $\angle BGO = \angle CXP = \angle BAO$, что и означает, что точки A, G, B и O лежат на одной окружности.

Замечание. Завершить решение можно по-другому, доказав, что точка G лежит на прямой AP (поскольку $\angle BPG = \angle BCA = \angle BPA$), и воспользовавшись равенством $\angle OGP = \angle CXP = \angle ABO$.

Комментарий. Доказано, что $\angle BGP$ не зависит от положения точки P — 1 балл.

Доказано, что при всевозможных положениях точки P все полученные точки G лежат на *некоторой* фиксированной окружности — 3 балла.




Рис. 5

- 10.5. Дано нечётное число $n > 10$. Найдите количество способов расставить по кругу в некотором порядке натуральные числа $1, 2, 3, \dots, n$ так, чтобы каждое число являлось делителем суммы двух соседних с ним чисел. (Способы, отличающиеся поворотом или отражением, считаются одинаковыми.) (Д. Храмов)

Ответ. Два способа.

Решение. Рассмотрим произвольную расстановку чисел от 1 до n , удовлетворяющую требованиям. Предположим, что два чётных числа x и y стоят рядом, а следующее за ними число — z . Так как $x + z$ делится на y , число z также чётно. Продолжая таким же образом движение по кругу, получим, что все числа в расстановке чётны, что невозможно. Итак, никакие два чётных числа не стоят рядом; значит, некоторые два нечётных числа стоят рядом, а остальные чётные и нечётные чередуются.

Заметим, что оба соседа числа n не могут быть чётными; действительно, в противном случае их сумма делилась бы на $2n$, то есть была бы не меньше $2n$. Значит, у любого нечётного числа, меньшего n , либо оба соседа чётны, либо одним из соседей является число n .

Предположим, что числа n и $n - 2$ — соседи, а другой сосед

числа $n - 2$ — число t . Число $t + n = (n - 2) + (t + 2)$ должно делиться на $n - 2$, что возможно лишь при $t = n - 4$. Но тогда три нечётных числа n , $n - 2$, $n - 4$ стоят подряд, что, как мы доказали, невозможно.

Итак, оба соседа нечётного числа $n - 2$ чётны, а потому их сумма делится на $2(n - 2)$, то есть эта сумма не меньше $2(n - 2)$; это возможно лишь если эти соседи — $n - 1$ и $n - 3$. В частности, числа $n - 1$ и $n - 2$ — соседи. Если пара $n - 1$, $n - 2$ продолжается далее числами, идущими подряд по убыванию вплоть до числа 1, мы приходим к круговой расстановке $n - 1$, $n - 2$, $n - 3$, $n - 4$, \dots , 3, 2, 1, n , которая, очевидно, удовлетворяет условию.

Предположим теперь, что пара $n - 1$, $n - 2$ продолжается далее числами, идущими подряд по убыванию, вплоть до числа $d > 1$, а после него следует число $x \neq d - 1$. Итак, у нас имеется подряд идущие по окружности числа $n - 1$, $n - 2$, \dots , $d + 1$, d , x , y , \dots . Так как $x + (d + 1) = (x + 1) + d$ делится на d , то $x + 1$ делится на d , в частности, $x \geq d - 1$. Но x отлично от чисел $d - 1$, d , \dots , $n - 2$, $n - 1$; значит, единственный оставшийся вариант — это $x = n$.

Пусть $n = 2k + 1$. Мы получили, что число $n + 1 = 2k + 2$ делится на d ; так как $d < n$, имеем $d \leq k + 1$. С другой стороны, $y \leq d - 1 \leq k$ (так как все числа, большие $d - 1$, уже использованы). Отсюда $d + y \leq (k + 1) + k = n$. Так как $d + y$ должно делиться на $x = n$, приходим к единственной возможности: $d = k + 1$, $x = n$, $y = k$. Итак, у нас имеются подряд идущие по окружности числа $2k$, $2k - 1$, $2k - 2$, \dots , $k + 2$, $k + 1$, $2k + 1$, k , a , \dots .

Так как $a \leq k - 1$ (все числа, большие $k - 1$, уже использованы) и число $(2k + 1) + a = 2k + (a + 1)$ делится на k , однозначно находим $a = k - 1$. Аналогично, если последовательность продолжается далее числами $k - 1$, $k - 2$, \dots , $b + 1$, b , идущими подряд по убыванию, а далее следует число y , однозначно находим $y = b - 1$ (поскольку $b + 1 + y$ делится на b , и $y \leq b - 1$). Итак, мы приходим к круговой расстановке $2k$, $2k - 1$, $2k - 2$, \dots , $k + 2$, $k + 1$, $2k + 1$, k , $k - 1$, $k - 2$, \dots , 1, которая, очевидно, удовлетворяет условию (и отлична от найденной ранее).

Замечание. Тем же методом, который использовался в решении, можно доказать, что в аналогичной задаче для чётного

$n > 10$ расстановка $n, n - 1, n - 2, n - 3, n - 4, \dots, 3, 2, 1$ — единственная, удовлетворяющая условию.

Комментарий. Только верный ответ или верный ответ с предъявлением одной из двух искомых расстановок — 0 баллов.

Баллы за следующие продвижения из разных пунктов а), б), в) суммируются.

а) Найдены два примера расстановок, удовлетворяющих условию — 1 балл.

б) Доказано, что числа $n - 1$ и $n - 2$ стоят рядом — 2 балла.

Если доказано только, что два чётных числа не стоят рядом — ставится 1 балл из этих 2.

в) В предположении, что $n - 1$ и $n - 2$ стоят рядом, доказано, что цепочка однозначно продолжается до одного из примеров $(n - 1, n - 2, n - 3, \dots, 2, 1, n)$ или $(2k, 2k - 1, 2k - 2, \dots, k + 1, 2k + 1, k, k - 1, k - 2, \dots, 1)$ — 4 балла.

Если доказано только, что продолжение имеет вид $(n - 1, n - 2, \dots, d + 1, d, n, \dots)$ при некотором d — ставится 1 балл из этих 4.

Если доказано, что продолжение имеет вид $(n - 1, n - 2, n - 3, \dots, 2, 1, n)$ или $(2k, 2k - 1, 2k - 2, \dots, k + 1, 2k + 1, k, \dots)$ — ставятся 3 балла из этих 4.