ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ БИОЛОГИЯ. 2025–2026 уч. г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7 КЛАСС

Максимальный балл за работу – 167. Часть 1


На каждый вопрос даны четыре варианта ответа. Выберите только <u>один</u> правильный. Максимальный балл за каждое задание - 5.

Задание 1.1

Австрийский учёный Карл фон Фриш был удостоен Нобелевской премии за открытие, которое он сделал в ходе серии экспериментов. Эта работа показала, насколько сложным может быть поведение, казалось бы, простых существ. Учёный поставил улей со стеклянной стенкой и на разном расстоянии от него размещал кормушки со сладким сиропом. Когда пчела-разведчик находила кормушку, учёный метил её краской и наблюдал за её поведением в улье. Он обнаружил, что вернувшаяся пчела исполняет особый танец. Если кормушка была близко (до 100 м), пчела исполняла круговой танец. Если кормушка была далеко, она исполняла виляющий танец (в форме восьмёрки). При этом направление и скорость «виляющей» части танца менялись в зависимости от расположения кормушки. После танца другие пчёлы вылетали из улья и безошибочно находили именно эту кормушку.

Какой главный вывод следует из описанных наблюдений?

Всероссийская олимпиада школьников. Биология. 2025–2026 уч. г. Муниципальный этап. 7 класс.



- а) Пчёлы запоминают дорогу к еде и могут вернуться к ней снова по зрительным ориентирам.
- б) Главную роль в поиске пищи у пчёл играет обоняние, так как танец помогает распространить запах нектара в улье.
- в) Танец пчелы это просто инстинктивная реакция на найденную еду, которая побуждает других пчёл к хаотичному поиску пищи.
- г) Пчёлы способны передавать друг другу точную и сложную информацию (о расстоянии и направлении) с помощью танца. Ответ:

¹ https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/Apis_mellifera_-_Prunus_padus_-_Keila.jpg/960px-Apis_mellifera_-_Prunus_padus_-_Keila.jpg


Всероссийская олимпиада школьников. Биология. 2025–2026 уч. г. Муниципальный этап. 7 класс.

Задание 1.2

Ученики исследовали поведение дождевых червей. Они поместили несколько особей в длинный ящик, разделённый на две зоны: в одной почва была сухой и освещённой, а в другой — влажной и тёмной. Черви могли свободно перемещаться между зонами. Что произошло с большинством червей через 20 минут после начала эксперимента и как объясняется этот результат?

- а) Черви равномерно распределились по всему ящику, потому что они, будучи активными хищниками, искали добычу на всей территории.
- б) Большинство червей собрались в сухой освещённой зоне, так как свет стимулирует их пищевую активность.
- в) Большинство червей собрались во влажной тёмной зоне, потому что у них выражена положительная реакция на влажность и отрицательная на свет.
- г) Все черви зарылись в почву в разных частях ящика, так как их активность не зависит от условий среды.

Отечественный учёный Г. Ф. Гаузе проводил следующий опыт с инфузориями двух видов: *P. aurelia* и *P. caudatum*. Эти виды культивировались по отдельности и совместно, в течение всего эксперимента регистрировались значения плотности популяций инфузорий. В качестве питательного субстрата инфузориям в среду подмешивали суспензию разведённого стерилизованного ила из пресного водоёма. Изучите предложенную схему эксперимента и выберите верное утверждение.




- а) P. aurelia является хищником, питающимся P. Caudatum.
- б) *P. aurelia* увеличивает размеры популяции эффективнее в присутствии *P. Caudatum*.
- в) Оба вида занимают одну и ту же экологическую нишу.
- Γ) P. caudatum более успешна в своей экологической нише по сравнению с P. aurelia.

_

² https://www.emaze.com/@AQCZIFOI?_escaped_fragment_=

Большинство инфузорий – представителей рода Vorticella обитают в пресных водоёмах и в почве как эпибионты: они прикрепляются стволиком к поверхности твёрдого субстрата и питаются путём фильтрации окружающего раствора.

Внутри клетки вортицеллы имеется крупный изогнутый макронуклеус и круглый микронуклеус. На фотографии показаны две клетки вортицеллы. Какой






- а) редукционное деление мейозом
- б) неравное деление митозом почкование
- в) равное деление митозом деление клетки на равные части
- г) конъюгация половой процесс обмена генетического материала между клетками

³ http://www.microscopy-uk.org.uk/index.html?http://www.microscopyuk.org.uk/full_menu_body.html

В пихтовом лесу можно выделить два слоя почвы – листовой опад (слой L) и поверхностный слой (слой S). В этих слоях почвы обитают микроорганизмы, деятельность которых можно изучать в лабораторных условиях.

В проведённом эксперименте были взяты пробы слоёв S и L. Эти пробы были смешаны с увлажнённой целлюлозой, чтобы создать питательную среду для микроорганизмов, разлагающих целлюлозу. размножения инкубировались в замкнутых камерах в течение 22 дней при постоянной температуре, влажности и освещении. Установленные в камерах датчики углекислого газа собирали данные об увеличении содержании этого газа в воздухе в ходе эксперимента. Изучите приведённые данные и выберите верное

утверждение.




- Предложенная схема эксперимента позволяет выявить активность микроорганизмов, живущих в анаэробных условиях.
- б) Углекислый газ накапливается благодаря тому, что микроорганизмы в пробах окисляют органические вещества в ходе кислородного дыхания и выделяют СО2.
- в) По скорости накопления углекислого газа в пробах S и L можно предположить, что в листовом опаде целлюлозу разрушают только бактерии, а в поверхностном слое почвы – только грибы.
- г) Активность микроорганизмов разрушителей клеточных стенок растений выше в поверхностном слое почвы по сравнению с листовым опадом. Ответ:

⁴ https://drive.google.com/file/d/1pOwZ2cyVSu6SAb35qEJRf89dcLGG_rZ8/view?usp=drive_link

На иллюстрации под цифрой 1 показан фрагмент некоторой водоросли. Размер её таллома достигает нескольких десятков сантиметров в длину, при этом всё слоевище представлено одной гигантской клеткой с множеством ядер. При половом размножении на участке таллома появляется зона, в которой ядра окружаются клеточными стенками, и в результате митоза образуются гаметы. Под обозначением 5а на иллюстрации показано слияние гамет в ходе оплодотворения.

Какой тип оплодотворения характерен для этой водоросли?




- а) изогамия
- б) гетерогамия
- в) оогамия
- г) гаметангиогамия

Ответ:

-

 $^{^5\} https://picryl.com/media/die-fische-der-siboga-expedition-1913-20294144193-742e7b$

На фотографии ниже запечатлена часть растения из рода *Ficus*. Какой тип корней можно увидеть на фотографии?




- а) боковые и придаточные корни
- б) только придаточные корни
- в) только главный корень
- г) зародышевые корни

 $^{^6 \, \}underline{https://uploads.tapatalk-cdn.com/20160218/66632ccc2b6299dbc6026ace74d0548f.jpg}$

Ткани растений, как известно, часто не ограничиваются выполнением только одной функции. Перед вами снимок, сделанный с помощью сканирующего электронного микроскопа. Какая функция НЕ характерна для ткани, показанной на фотографии В?

Длина масштабных отрезков соответствует 1 мм (А) и 50 мкм (В).



- а) барьерная
- б) покровная
- в) абсорбционная
- г) ассимиляционная


Ответ:

_

⁷ <u>https://www.researchgate.net/profile/Milada-Ciamporova/publication/247884490/figure/fig1/AS:668914094731267@1536492956321/Alfalfa-root-tip-revealed-by-scanning-electron-microscopy-A-View-of-the-whole-tip_W640.jpg</u>

Залание 1.9


С этим растением знаком каждый, кто пробовал блюда восточноазиатской кухни. Эутрема японская используется для приготовления приправы васаби. На ботанической иллюстрации вы можете рассмотреть её четырёхлепестные венчики и соцветия-кисти. Не правда ли, в этом растении есть что-то очень знакомое? Конечно, ведь эутрема принадлежит к семейству Крестоцветные, и она имеет подземный запасающий орган, который показан на фотографии. Рассмотрите структуру этого органа. Какое описание ему подходит?




- а) Корни, которые могут развиться на этой структуре, будут являться боковыми.
- б) Предложенная структура несёт листья с узкими листовыми основаниями.
- в) Для этой структуры характерно накопление питательных веществ в запасающей паренхиме главного корня.
- г) На предложенной структуре можно найти пазушные почки. Ответ:

⁸ https://usercontent.one/wp/antropocene.it/wp-content/uploads/2022/09/Eutrema-japonicum.jpg?media=1757747761

⁹https://www.waysidegardens.com/cdn/shop/files/Product_MediaImage_29889_5.jpg?v=17531575 88&width=1445






- а) Паслёновые. Растение имеет простые очерёдные листья, цветок с сростно-лепестным венчиком в форме длинной трубки и плод-коробочку.
- б) Бобовые. Для растения характерны сложные листья, мотыльковый венчик и плод-боб.
- в) Злаки. Стебель этого растения соломина с полыми междоузлиями, соцветие сложный колос, плод зерновка.
- г) Сложноцветные. Многочисленные мелкие цветки собраны в соцветие корзинку, плод семянка.

¹⁰ https://disk.yandex.ru/i/tUob19hczAaSVQ

Внимательно рассмотрите фрагмент картины Сальвадора Дали «Постоянство памяти». На картине можно заметить представителей двух отрядов насекомых. Муравьи для Сальвадора Дали были мощным символом смерти, разложения и разрушения, основанным на детском потрясении от вида муравьёв, пожирающих останки летучей мыши. Выберите верную комбинацию отрядов, к которым относятся изображённые насекомые.




11

- а) Перепончатокрылые и Чешуекрылые
- б) Полужесткокрылые и Двукрылые
- в) Перепончатокрылые и Двукрылые;
- г) Жесткокрылые и Перепончатокрылые. Ответ:

 $^{^{11}\} https://avatars.mds.yandex.net/i?id=5b9b7a6e9d60081720df5b56aded1113_l-8251944-images-thumbs\&n=13$

Представители хелицеровых весьма разнообразны по организации своих органов дыхания. Среди перечисленных организмов выберите отряд, для представителей которого характерно исключительно трахейное дыхание.




 $^{^{12}\ \}underline{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Opiliones_harvestman.jpg}$

¹³https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Limulus_polyphemus_%28Atlantic_Horse shoe_Crab%29_adult_underside_%2826923436154%29.jpg

¹⁴https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Scorpion_Photograph_By_Shantanu_Kuve_skar.jpg


¹⁵ https://aranei.narod.ru/agel.jpg

Задание 1.13 Посмотрите на изображение амфибии, поражённой паразитом. Ниже перечислены некоторые признаки этого паразита.



Тело имеет усечённый задний и суженный передний конец. Имеются два выпячивания пищевода, расположенные по бокам тела примерно на середине его длины. В выделительной системе имеются две основные собирательные трубочки, которые выходят из выделительного пузыря и тянутся вперёд. Внутри трубочек содержатся крупные светопреломляющие гранулы. Длина тела составляет до 800 мкм, а ширина — примерно 200 мкм. У некоторых представителей между ротовой присоской и глоткой может присутствовать розоватая окраска. Однако этот признак не всегда заметен и может варьироваться.

Выберите изображение паразита, заразившего амфибию.



Ответ:

¹⁶https://en.wikipedia.org/wiki/Ribeiroia ondatrae#/media/File:P. regilla with parasite-induced_limb_malformation.png


¹⁷ https://www.happydoctor.ru/img2/1773_3.jpg

¹⁸ https://wcvm.usask.ca/learnaboutparasites/parasites/trypanosoma-cruzi.php

¹⁹ https://www.researchgate.net/figure/Adult-stage-of-Fasciola-hepatica fig1 349460253

²⁰ https://fish.uw.edu/2020/08/new-studies-show-how-to-save-parasites-and-why-its-important/

Многие растения вступают в симбиоз с грибами, образуя микоризу (грибокорень). Какое из следующих утверждений наиболее точно описывает главное преимущество, которое получает растение от этого симбиоза?



- а) Гриб защищает растение от поедания травоядными животными с помощью ядовитых веществ.
- б) Гриб-симбионт снабжает растение органическими веществами (например, сахарами) для его питания.
- в) Гифы гриба действуют как продолжение корневой системы, многократно увеличивая поглощение воды и минеральных солей из почвы.
- г) Растение получает от гриба готовые витамины и фитогормоны, необходимые для его роста.

Ответ:

15

 $^{^{21} \ \}underline{https://disk.yandex.ru/i/TmXleU1et61qmg}$

Задание 1.15 Во время прогулки на даче в Московской области Алина сделала фотографию.



22

Скорее всего, эта фотография сделана:

- а) зимой во время оттепели
- б) летом во время заморозков
- в) ранней осенью
- г) весной во время заморозков


 $^{^{22}\} https://wallpapers.com/images/hd/a-vibrant-clownfish-in-natural-habitat-us8ypgmafvm331mc.jpg$

Часть 2

Вам предлагаются тестовые задания с множественными вариантами ответа (от 1 до 5). Ваше решение относительно каждого (выбор, верен данный вариант ответа или нет) оценивается в 2 балла. За ошибочное решение вычитается 2 балла. Минимальное количество баллов за каждое задание — 0. Максимальный балл — 10.

Задание 2.1

Исследователи провели эксперимент по газообмену у пшеницы. Днём условия выращивания растений из контрольной и экспериментальной групп не отличались. Ночью у растений пшеницы из экспериментальной группы атмосферу обогащали газом X, контрольные растения при этом не трогали. Результат приведён на рисунке ниже, растение из контрольной группы обозначено K, а растение из экспериментальной обозначено Э. Выберите утверждения, верно описывающие причину результатов данного опыта.




- а) В тёмное время суток скорость дыхания пшеницы выше скорости фотосинтеза.
- б) Газом X может быть углекислый газ.
- в) Растениям в темноте необходим углекислый газ, чтобы включать его в состав сахаров и тем самым обеспечивать клетки энергией.
- г) В темноте в митохондриях у растений происходят процессы дыхания, поставляющие энергию клеткам.
- д) Инициация цветения и газообмен два не связанных между собой процесса, которые регулируются совершенно разными факторами. Ответ:

²³ https://drive.google.com/file/d/1j96JwyVb-CBOeFD8PBnfSnYbZT3Fi6Ej/view?usp=sharing

Задание 2.2

На микрофотографии с электронного сканирующего микроскопа белой треугольной стрелкой отмечена некоторая структура шляпочного гриба шампиньона. Какие характеристики ей подходят?



- а) Данная структура является местом протекания мейоза в жизненном цикле шампиньона.
- б) Эта структура производит экзогенные споры.
- в) Отмеченная стрелкой структура имеет два гаплоидных ядра на протяжении всего периода своего существования.
- г) Эту структуру можно найти на грибнице шампиньона в толще почвы.
- д) Образующиеся на этой структуре споры идентичны по содержащемуся в них генетическому материалу.

 $^{^{24}\ \}underline{https://drive.google.com/file/d/1KmDreWl0GcXIsFNE0fR7vhCU--jSgtyv/view?usp=drive_link}$

Залание 2.3

Проходя через парк, весь усыпанный осенними листьями, Миша вдруг задумался: «Каждый год одно и то же! Осенью деревья сбрасывают листья, весной отращивают новые. И ведь на это уходит столько энергетических ресурсов растения. А ведь можно было бы и не избавляться от них вовсе!» Как вы думаете, зачем, в самом деле, деревья средней полосы сбрасывают листья каждый год?




- а) К осени в листьях «иссякает» запас пигментов, нужных для фотосинтеза, поэтому следующей весной они уже не будут способны к фотосинтезу.
- б) Большая площадь поверхности листьев опасна при снегопадах.
- в) Посредством листьев деревья всё время испаряют воду, которая в холодное время становится недоступна, поэтому деревьям, не сбросившим листья, грозит пересыхание.
- г) Опадение листьев осенью не имеет функционального значения, но определяется изменением длины светового дня и составом атмосферы в осеннезимний период.
- д) Сбрасывая листву, дерево избавляется от вредных веществ, которые накапливаются в листьях.

²⁵ https://stihi.ru/pics/2021/10/03/945.jpg

Задание 2.4

Выберите верные утверждения о симбиозе корней растений с азотфикси-

рующими бактериями.



- а) Этот тип симбиоза характерен для многих растений семейства Бобовые (горох, клевер, фасоль).
- б) Бактерии-симбионты живут на поверхности корня и не проникают внутрь его клеток.
- в) В результате симбиоза растение получает от бактерий доступные соединения азота, а бактерии от растения – органические вещества.
- г) Симбиоз происходит в специальных образованиях на корнях клубеньках.
- д) Азотфиксирующие бактерия могут жить в почве самостоятельно, но их активность в клубеньках значительно выше. Ответ:

20

²⁶ https://disk.yandex.ru/i/apnRGw9Ob4e9qA

Всероссийская олимпиада школьников. Биология. 2025–2026 уч. г. Муниципальный этап. 7 класс.

Задание 2.5

Почему такие животные, как божья коровка и оса, имеют яркую, контрастную, хорошо заметную окраску, в то время как зелёный кузнечик или заяц-беляк зимой, наоборот, имеют окраску, сливающуюся с окружающей средой?

- а) Покровительственная окраска всегда является признаком жертвы, которая вынуждена прятаться, в то время как яркая окраска признак хищника, которому некого бояться.
- б) Яркая, демаскирующая окраска осы и божьей коровки является предупреждающим сигналом для хищников, сообщающим об опасности (наличии жала) или несъедобности.
- в) Яркая окраска это способ демонстрации доминантного положения в группе, она помогает отпугивать конкурентов своего вида от источников пищи.
- г) Окраска кузнечика и зайца-беляка является покровительственной (маскирующей), её главная задача сделать животное как можно менее заметным на фоне окружающей среды.
- д) Разница в окраске объясняется терморегуляцией: яркие и тёмные цвета лучше поглощают солнечное тепло, а светлые (белый) отражают его. Ответ:

Часть 3

Выберите верные суждения. Ваше решение относительно каждого (выбор, верно данное суждение или нет) оценивается в 4 балла. За ошибочное решение вычитается 4 балла. Минимальное количество баллов за часть 3 — 0. Максимальный балл — 20.

Задание 3.1

Грегарины, относящиеся к споровикам, способны к передвижению с помощью жгутика.




Ответ:

27

²⁷ https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/013/832.htm

Задание 3.2


фотографии показана колониальная морская диатомовая водоросль Asterionella. Верно ли, что её клеточная стенка содержит оксид кремния?



Ответ:

Задание 3.3

На фотографии показана базидиоспора плеснево-дрожжевого гриба Itersonilia. В основании базидиоспоры имеется ножка, которая увеличивается в объёме благодаря накоплению воды. Верно ли, что эта особенность необходима грибу для распространения спор на большое расстояние в результате баллистоспории?



²⁸ http://www.microscopy-uk.org.uk/mag/smallimag/asteri.jpg

²⁹ https://www.semanticscholar.org/paper/More-g%27s-than-the-Space-Shuttle:-ballistospore-Money/f8d7d21d81afe7c664e079af3c806806835a09bb

Задание 3.4

Все растения-хищники (например, росянка) перешли к хищничеству из-за нехватки солнечного света в местах их обитания.



Ответ:

Задание 3.5

склерофитов местообитаниям К засушливым Адаптации заключаются в уменьшенных листовых пластинках и обширной корневой системе.



31

 $^{^{30}\} https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/Drosera_rotundifolia_-rotundifoli$

_Pосянка_в_НПП_%22Слобожанский%22.jpg/1200px-Drosera_rotundifolia_-


https://www.plantarium.ru/dat/plants/9/933/612933_03fc9aa7.jpg

Часть 4

За каждое верное соотнесение начисляется 2 балла. За каждое неверное соотнесение вычитается 2 балла. Минимальное количество баллов за каждое задание -0.

Задание 4.1

Сопоставьте внутренние органы дельфина (1–6) и их названия (A–E). Органы 32



Названия

11a3ballini			
A	лёгкие		
Б	желудок		
В	почка		
Γ	половая система		
Д	печень		
Е	сердце		

Орган	1	2	3	4	5	6
Название						

³² https://disk.yandex.ru/i/kivHZiTkTtW8mw

Задание 4.2 Соотнесите генеративные органы цветковых растений (1–5) с плодами (А-Д), которые из них развиваются после оплодотворения.

I енеративные органы						
1 ³³		2 ³⁴				
3 ³⁵		4 ³⁶				
5 ³⁷						

_

³³ https://figures.academia-assets.com/71838639/figure_001.jpg

³⁴ https://www.minnesotawildflowers.info/udata/r9ndp23q/pd/fragaria-vesca-2.jpg

³⁵ https://assets.highcountrygardens.com/media/catalog/product/b/e/beauty-of-livermere-orientalpoppy1.jpg?quality=85&fit=bounds&height=&width=3840&auto=webp&format=pjpg


³⁶ https://tenmilecreeknursery.com/cdn/shop/products/sacred-lotus-

⁷⁷³⁴⁷⁹_1200x1200.jpg?v=1695727196

³⁷https://plantmegreen.com/cdn/shop/articles/es8Dzrc4TvFCgMfwijxcl1drpTfdwdGp1646405356.jpg?crop=center&height=1200&v=1646856089&width=1200

Всероссийская олимпиада школьников. Биология. 2025–2026 уч. г. Муниципальный этап. 7 класс.

Плоды



Ответ:

Генеративные органы	1	2	3	4	5
Плоды					

 $^{38}\ https://live.staticflickr.com/8881/17982864298_4bfb5daca6_z.jpg$

³⁹ https://thumbs.dreamstime.com/b/half-kiwi-fruit-isolated-white-ripe-background-full-depth-field-143799332.jpg

⁴⁰ https://www.specialfruit.com/en/thumbnail/productFull/product-1422870193/pomegranate.jpg

⁴¹ https://media.istockphoto.com/id/489591865/photo/fresh-lotus-seed-pod-sale-in-market-thailand-close-up.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=wud2Cdte5RPcjsfFzzAStSiV3nS0jwwpXf0I6zZBRGM= ⁴² https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c5/Fragaria_viridis_fruit_-

_Keila.jpg/250px-Fragaria_viridis_fruit_-_Keila.jpg